



## **Información Acerca de la Adenoidectomía**

Este procedimiento se recomienda cuando el tejido que llamamos “adenoide” empieza a causar infecciones en la nariz, el oído, o causa obstrucción respiratoria. El adenoide se encuentra en la parte mas superior de la garganta. En el área que se nombra la rinofaringe; esta es la parte de la anatomía donde la nariz y la garganta se unen. A veces, el adenoide que crece demasiado puede causar infecciones en el oído, o también síntomas que se confunden con síntomas de sinusitis. Cuando el adenoide causa obstrucción constante en la nariz, puede alterar como crecen los dientes. Esto puede causar problemas ortodónticos.

### **En el día de la cirugía...**

Su hijo/a no debe de comer o beber nada 8 horas antes de la cirugía, a menos de que nosotros le demos alguna diferente orden.

Anestesia general se le administrará a su hijo/a por el anesthesiólogo pediátrico. Después de que esté el paciente bajo anestesia general, un tubo respiratorio, y suero se usará por el resto de el procedimiento. Después de la cirugía, el paciente se lleva a la sala de recuperación en donde va a continuar en monitores. El paciente se reunirá con su familia, nada mas que despierte de la anestesia general. A veces nausea y dolor ocurre. El anesthesiólogo pediátrico le administrará medicamento para controlar esos síntomas.

### **Después de la cirugía...**

Dolor es común y esperado. En la mayoría de niños, el dolor se puede controlar con Tylenol™, Advil™, o Motrin™. En ciertos casos y dependiendo en la edad del paciente, medicamento con narcótico puede ser necesario. También, no es raro que en el primer día, su hijo/a no quiera comer mucho. Es importante, que el padre constantemente anime a su hijo/a a comer y tomar líquidos. Puede empezar con comidas blandas y progresar a una dieta normal.

Otros síntomas que también son común, incluyen fiebre de bajo grado (<102°), un cambio temporario en la voz, goteo post-nasal, mal aliento, rigidez en el cuello, y dolor en el oído. Tos también es común y la mayoría de las veces controlada con medicamento OTC. Si la tos no se controla fácilmente, debe de llamar a su médico.

Sangrado es extremadamente raro después de un adenoidectomía, pero si usted nota que su hijo/a escupe sangre fresca continuamente, debe de informarle inmediatamente a su médico.

Infección es rara después de la adenoidectomía pero puede suceder. Si su medico sospecha una infección aguda, le recetará antibióticos.

Si tiene alguna otra pregunta, por favor de llamar a nuestro consultorio:

**210-733-4368. Gracias por su confianza.**